



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่าย ☐ บริหาร ☒ บริการ
☐ แผนและงบประมาณ
เลขรับที่ ๓๓๓
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๐๓

ส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค

ที่ สน.สส. ๑๐๘๖/๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำมาตรการป้องกันโรคจากยุงลายที่ได้ผลดีที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากยุงลาย ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวนทราบถึงแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างถูกต้อง

ในการนี้ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโครงการของยุทธศาสตร์และงบประมาณประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลนครบ้านสวน ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

- เพื่อโปรดทราบ

- สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคจากยุงลายที่ได้ผลดีที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากยุงลาย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลนครบ้านสวนให้ประชาชนรับทราบต่อไป

- เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website เทศบาล, Facebook Fanpage เทศบาล, เสียงตามสาย, รถกระจายเสียง

ณ

(นางสาวนฤพร ส่งศิลป์สอาด)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

๑ เม.ย. ๒๕๖๘

(นางสาวธีราพร ทุมมานนท์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

๑ เม.ย. ๒๕๖๘

(นายปิยะ เล็งอุย)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

๑ เม.ย. ๒๕๖๘

(นางสาวตยาภรณ์ สุนทรขึ้น)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทราบ

(นางกิริดา สุนิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑ เม.ย. ๒๕๖๘

มาตรการป้องกันโรคจากยุงลายที่ได้ผลดีที่สุด

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่มีผลดีและทำให้สิ้นเปลืองเพราะสารเคมีที่ใช้พ่นกำจัดยุงลายนั้น ยุงสามารถสร้างความต้านทานได้เพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าพ่นบ่อยเกินไปจะทำให้ยุงดื้อยา ในอนาคตอาจเจอเหตุการณ์ยุงที่ถูกพ่นสารเคมีหมอกควันแล้วไม่ตาย การเกิดยุงลายนั้นเริ่มจากลูกน้ำในน้ำ มีระยะจากไข่มาเป็นตัวยุง 7 - 14 วัน สมมติเราพ่นวันนี้เรากำจัดยุงได้หมดชุดหนึ่ง แต่ภายใน 7 วัน ยุงชุดใหม่ปริมาณเดิมจะกลับมาใหม่ ถ้าเราไม่กำจัดยุงในน้ำ (ไข่ยุงลาย ลูกน้ำยุงลาย) การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายจะทำเฉพาะเมื่อมีคนเป็นไข้เลือดออก คนเป็นไข้เลือดออก 1 คน แปลว่ายุงในละแวกนั้นต้องมีโอกาสมีเชื้อไข้เลือดออกแน่ ๆ ดังนั้นจึงพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อให้ช่วง 2-3 วันนั้น ยุงที่มีเชื้อและไม่มีเชื้อได้ตายไปหมด เป็นการควบคุมการแพร่กระจายโรคซาลง แต่ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดเพราะเชื้อไข้เลือดออกถ่ายทอดจากยุงตัวแม่ไปสู่ไข่ได้ ยุงที่เพิ่งขึ้นจากน้ำก็มีเชื้อได้ การแก้ที่ต้นเหตุ คือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดำเนินตามมาตรการ 5ป1ข ได้แก่ 1.ปิดฝาโอ่ง ฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด 2.เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัว 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน 5.ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำและเป็นนิสัย และขัดไข่ยุงลายออกจากขอบภาชนะใส่น้ำ ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง 2.เก็บขยะที่อยู่ในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน 3.เก็บน้ำภาชนะที่ใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคไข้วัดข่อยยุงลาย 3.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันโรคจากยุงลายที่ได้ผลดีที่สุด